

Storosios žarnos
vėžys ankstyvose
stadijose dažnai
**nesukelia jokių
simptomų.**

Labai svarbu tikrintis
profilaktiškai – net jei
jaučiatės visiškai
sveiki.

Kaip dalyvauti programoje?

- ✓ Kreipkitės į savo šeimos gydytoją.
- ✓ Bus atliktas slapto kraujavimo išmatose (iFOBT) testas.
- ✓ Jei testas teigiamas, gydytojas išduos siuntimą kolonoskopijai.
- ✓ Prireikus gali būti atliekama biopsija diagnozei patvirtinti.



Kilus papildomų
klausimų apie
programą, kviečiame
kreiptis į pirminės
asmens sveikatos
priežiūros įstaigą.



Storosios
žarnos vėžio
prevencija



Visos programos paslaugos
NEMOKAMOS

**MOTERIMS IR
VYRAMS
50–74 m.**

Lietuvoje vykdoma storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa



50–74 m.
metų vyrams
ir moterims



Slapto kraujavimo
išmatose testas
atliekamas kartą per
2 metus.

Profilaktinė patikra padeda anksti nustatyti ligą ir gali išgelbėti gyvybę.

Kodėl verta pasitikrinti?

- ✓ Tyrimas padeda anksti nustatyti storosios žarnos vėžį ir ikivėžinius pakitimus.
- ✓ Anksti nustačius ligą, gydymas būna daug veiksmingesnis.



Storosios žarnos vėžio galimi simptomai



- ✓ Tuštinimosi įpročių pokyčiai.
- ✓ Kraujas išmatose.
- ✓ Svorio kritimas.
- ✓ Nuovargis ir silpnumas.
- ✓ Nuolatinis diskomfortas pilve.
- ✓ Guzelis pilve arba išangėje.
- ✓ Anemija ir lėtinis nuovargis.
- ✓ Gleivės išmatose.
- ✓ Nepilno tuštinimosi pojūtis.
- ✓ Reguliarus skausmas ir pilvo pūtimas.



**Klauskite
savo šeimos
gydytojo jau
šiandien!**

Neignoraukite storosios žarnos vėžio simptomų – jų atpažinimas ir laiku atlikti tyrimai padeda ligą nustatyti anksti ir pasiekti geresnių gydymo rezultatų.